

Corso di Meccanica Statistica
Proff. A. Crisanti, I. Giardina e M. Grilli
Compito del 15.07.2019

Si consideri un sistema costituito da N particelle identiche, di massa m , non interagenti, vincolate a muoversi su un piano, in una regione di area A , con Hamiltoniana di singola particella:

$$H(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = c\sqrt{p_x^2 + p_y^2 + m^2 c^2} \quad \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2, \mathbf{q} \in A \subset \mathbb{R}^2,$$

dove c è la velocità della luce. Il sistema è a contatto con un bagno termico a temperatura T .

1. Assumendo che sia applicabile la statistica classica e che il sistema sia in equilibrio alla temperatura T :

- 1.a) Calcolare la densità di probabilità $\mathcal{P}(\epsilon)$ dell'energia di singola particella.
- 1.b) Calcolare l'energia media per particella $E(T)/N$ in funzione della temperatura T .
- 1.c) Calcolare l'entropia $S(T)$ in funzione della temperatura.
- 1.d) Calcolare il valore più probabile $\bar{\epsilon}$ dell'energia di singola particella e la probabilità $P(n; N)$ che n particelle abbiano energia $\epsilon < \bar{\epsilon}$.

2. Assumendo che il sistema sia composto da Bosoni di spin 0:

- 2.a) Dimostrare l'esistenza o meno della condensazione di Bose-Einstein.
- 2.b) Mostrare che nel limite di alta temperatura $T \gg 1$ l'energia media per particella $E(T)/N$ è data dall'espressione ottenuta con la statistica classica al punto 1.b).

3. Assumendo che il sistema sia composto da Fermioni di spin 1/2:

- 3.a) Determinare l'energia di Fermi ϵ_F in funzione della densità delle particelle.
- 3.b) Calcolare l'energia media per particella $\epsilon(T) = E(T)/N$ a temperatura nulla in funzione dell'energia di Fermi ϵ_F .

• Valutazione risposte:

- 1.a: 4, 1.b: 4, 1.c: 4, 1.d: 4
2.a: 4, 2.b: 3
3.a: 4, 3.b: 3

• Risposte

Nota: La costante di Boltzmann k_B è presa uguale a 1, di conseguenza $\beta^{-1} = T$.

1.a) Per un sistema di particelle indipendenti si ha:

$$\mathcal{P}(\epsilon) = \frac{G(\epsilon) e^{-\beta\epsilon}}{\int d\epsilon G(\epsilon) e^{-\beta\epsilon}},$$

da cui usando:

$$G(\epsilon) = \int \frac{d^2p d^2q}{h^2} \delta[\epsilon - H(\mathbf{p}, \mathbf{q})] = \frac{2\pi A}{h^2 c^2} \epsilon \theta(\epsilon - mc^2),$$

si ha

$$\mathcal{P}(\epsilon) = \frac{\beta^2 \epsilon}{1 + \beta mc^2} e^{-\beta(\epsilon - mc^2)} \theta(\epsilon - mc^2).$$

1.b) Usando la relazione

$$E/N = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1,$$

con

$$Z_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} d\epsilon G(\epsilon) e^{-\beta\epsilon},$$

valida per particelle indipendenti, si ha:

$$E/N = \frac{2T + mc^2}{1 + \beta mc^2} + mc^2.$$

1.c) Dalla relazione

$$S = \beta(E - F),$$

dove E è l'energia ed F è l'energia libera del sistema si ha

$$S/N = \ln \left[\frac{2\pi A}{N\beta^2 h^2 c^2} (1 + \beta mc^2) e^{\frac{3+2\beta mc^2}{1+\beta mc^2}} \right].$$

1.d) Il valore richiesto è

$$\bar{\epsilon} = \operatorname{argmax}_{\epsilon} \mathcal{P}(\epsilon).$$

e vale

$$\bar{\epsilon} = \begin{cases} mc^2 & T \leq mc^2, \\ T & T > mc^2. \end{cases}$$

La probabilità richiesta è

$$P(n; N) = \delta_{n,0}^{\text{Kr}}, \quad T \leq mc^2,$$

dove $\delta_{n,0}^{\text{Kr}}$ è la delta di Kronecker

$$P(n; N) = \frac{N!}{n! (N-n)!} p_1^n (1-p_1)^{N-n}, \quad T > mc^2$$

con

$$p_1 = 1 - \frac{2}{1 + \beta mc^2} e^{\beta mc^2 - 1}.$$

2.a)

$$\lim_{\mu \rightarrow mc^2} \frac{2\pi A}{h^2 c^2} \int_{mc^2}^{\infty} d\epsilon \frac{\epsilon}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1} = \infty \quad \Rightarrow \quad \text{Non esiste condensazione BE.}$$

2.b) Per $T \gg 1$

$$E(T) \sim z \int_{-\infty}^{+\infty} d\epsilon \epsilon G(\epsilon) e^{-\beta\epsilon} = \frac{2\pi A z}{h^2 c^2} \beta^{-3} (2 + 2\beta mc^2 + \beta^2 m^2 c^4) e^{-\beta mc^2},$$

ed

$$N \sim z \int_{-\infty}^{+\infty} d\epsilon G(\epsilon) e^{-\beta\epsilon} = \frac{2\pi A z}{h^2 c^2} \beta^{-2} (1 + \beta mc^2) e^{-\beta mc^2}.$$

Eliminando z otteniamo

$$E/N \sim \frac{2T + mc^2}{1 + \beta mc^2} + mc^2, \quad T \gg 1.$$

3.a) A $T = 0$ si ha:

$$N = 2 \int_{-\infty}^{\epsilon_F} d\epsilon G(\epsilon)$$

da cui:

$$\epsilon_F = \sqrt{m^2 c^4 + \frac{h^2 c^2 \rho}{2\pi}} = mc^2 \sqrt{1 + \frac{h^2}{2\pi m^2 c^2} \rho}.$$

con $\rho = N/A$.

3.b) Dalla relazione

$$E(T=0) = 2 \int_{-\infty}^{\epsilon_F} d\epsilon G(\epsilon) \epsilon$$

si ha

$$E(T=0) = \frac{4\pi A}{3h^2 c^2} [\epsilon_F^3 - (mc^2)^3].$$

Da cui

$$\epsilon(T=0) = E(T=0)/N = \frac{2}{3} \frac{\epsilon_F^2 + \epsilon_F mc^2 + (mc^2)^2}{\epsilon_F + mc^2}.$$